

## Wrzody żołądka

Wrzody żołądka są coraz częstszym problemem u koni, i to – jak pokazują ostatnie badania – zarówno u źrebiąt jak i dorosłych koni w różnym wieku, niezależnie od sposobu użytkowania.

### Przyczyny

Główną przyczyną wrzodów jest stres, a także złe warunki utrzymania i niedopasowane żywienie.


Stres u koni może wywołać wiele czynników, np. intensywny trening, transport, zmiana stajni, ale także wprowadzenie nowego konia do stada lub walka o hierarchię wewnątrz stada. Jest wiele czynników, które mogą prowadzić do powstania wrzodów u koni. Do nich należą np. jednakowy intensywny trening, który przyczynia się do wywołania stresu, czy niektóre leki. Warunki stresowe mogą zaistnieć przy załadunku rumaka do przyczepki, zmiana stajni czy inna zmiana struktury socjalnej wewnątrz stada.

Do częstych przyczyn wrzodów zalicza się warunki utrzymania. Konie, jako zwierzęta stepowe, spędzały 24 godziny na świeżym powietrzu, ciągle przemieszczały się a głównym ich zajęciem było spożywanie pokarmu. Dzisiaj wiele koni spędza prawie całą dobę w boksie, w którym mogą tylko kręcić się w koło.

Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym wrzodom, jest sposób żywienia konia. Naturalnym pokarmem koni jest pasza objętościowa – trawy, siano etc. – spożywana przez większą część doby. Natomiast konie sportowe i rekreacyjne często żywione są dużymi ilościami paszy treściwej, dawanymi 2-3 razy dziennie, podczas gdy produkcja kwasów żołądkowych odbywa się nieprzerwanie 24 godziny na dobę niezależnie czy jest czy nie ma treści w żołądku. Następstwem produkcji kwasów na pusty żołądek jest jego oddziaływanie na wrażliwą błonę śluzową. Prowadzi to do powstania podrażnienia, następnie zapalenia, a ostatecznie do powstania wrzodów.

Do owrzodzenia żołądka przyczyniają się także rozwijające się tam larwy gźów, dlatego tak ważne jest regularne odrobaczanie koni, szczególnie w sezonie letnio-jesiennym.

Powstawaniu wrzodów sprzyjają także niektóre leki, w szczególności długotrwałe stosowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych.




### Objawy

Objawy wrzodów żołądka mogą być różne. Niektóre konie są osowiałe lub tylko mało „wesole”, mniejsza się ich wydolność wysiłkowa. Inne gorzej jedzą przede wszystkim pasze treściwe. Czasem pokazują objawy kolkowe, biegunki, zatkania, ich sierść jest matowa. Wiele koni traci na wadze bez wyraźnej przyczyny.

## Diagnostyka

Objawy mogą sugerować występowanie wrzodów u konia (Equine Gastric Ulcer Syndrom), jednak diagnozę postawić można tylko w oparciu o badanie gastroskopowe.

Badanie gastroskopowe można przeprowadzić w stajni, jednak koń musi być starannie przygotowany do badania. Pacjent musi być po 16-godzinnej głodówce konia (koń w tym czasie powinien stać w boksie wyściełanym trocinami/torfem lub mieć założony kaganiec), przez ostatnie 4 godziny przed badaniem koń nie powinien także pić. Badanie przeprowadza się na lekkiej sedacji. Gastroskop wprowadza się przez jamę nosową do żołądka, a następnie po wypełnieniu żołądka powietrzem ogląda się błonę śluzową.



## Profilaktyka

Chcąc zminimalizować ryzyko wystąpienia wrzodów u swojego konia, powinniście:

- dawać więcej pasz objętościowych,
- przed posiłkiem z paszy treściwej, pozwolić koniowi przez minimum 15 minut spożywać paszę objętościową (innymi słowy podawać najpierw siano, potem owies i granulaty),
- stosować częstsze posiłki paszy treściwej, jednak w mniejszej objętości,
- konie możliwie często i długo pozostawiać na łąkach,
- starać się ograniczyć czynniki stresowe,
- kontrolować intensywność treningu.

## Filmy:

- **Owrzodzenie żołądka**
- **Larwy gzów w żołądku**